

Nieuwsbrief december 2018



Langs deze weg willen we iedereen goede eindejaarsfeesten toewensen. Een prettig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2019.

In de 2^{de} week van januari zijn we aanwezig op Agriflanders.

Iedereen is welkom op onze stand met nummer 1264, in hal 1.



Bronststimulatie bij fokgelten (op jonge leeftijd):


Een vaste regel bij 1^{ste} dekking van fokgelten is dat het op de derde of vierde bronst is. Als je weet dat gelten een eerste keer bronstig worden rond de leeftijd van 24-25 weken dan kom je al snel dat gelten gedekt worden tussen een leeftijd van 33 (2^{de} bronst) tot 37 (4^{de} bronst) weken. Bij later aandekken van de fokgelt zal je een nog hoger levend geboren bekomen.

Door gelten op een jongere leeftijd aan te dekken zal de kost om de gelten in te voegen zakken. Ze zullen minder voeder nodig hebben, minder mest produceren en zullen hun volledige carrière wat lichter zijn waardoor ze altijd wat minder voeder nodig hebben voor onderhoud. Ook de aankoopprijs zal zakken bij aankoop van jongere fokgelten.

Er moet wel rekening mee gehouden worden dat je niet zomaar de gelten jonger mag beginnen dekken. Door te zakken in aandeleeftijd zal ook het levend geboren zakken. Om dit op te vangen is beercontact op jonge leeftijd van de gelten belangrijk.

Door vroeg beercontact te geven zal de eerste bronst ook vroeger optreden, en zal je dus op jongere leeftijd aan de 4^{de} bronst komen. Een zoekbeer voorzien speciaal voor de quarantaine of opfokstal is zeker nuttig. Let wel, de zoekbeer pas bij de gelten laten 2 weken na aankomst van de nieuwe fokgelten. Zorg dat de zoekbeer ook regelmatig de nodige vaccinaties krijgt. Hieronder zie je een grafiek van een onderzoek uit Amerika van Patterson en Foxcroft. Hieruit blijkt dat beercontact vanaf 20 weken leeftijd in vergelijking met 23

weken leeftijd reeds een duidelijk gevolg had op leeftijd van de 1^{ste} bronst. Hoe vroeger gelten gestimuleerd worden, hoe vroeger ze een eerste maal bronstig worden.



Door vroeg met bronststimulatie te starten kan je de fokgelten vroeger inspannen en zal de kost om tot de eerste worp te komen lager zijn.

Om een vlotte stimulatie te bekomen is het handig om **hekkens** te hebben **als hokdeuren**.

Dan kan de zoekbeer in de gang lopen en kan er contact zijn met de gelten via hekkens. Zorg ook voor een aangepast lichtschema voor de gelten. Door **voldoende licht** zal de bronst ook beter optreden. **Markeer** de **fokgelten** ook die **bronstig** zijn geworden.

Aanvoerplanning:

Verder willen wij nog eens benadrukken, om tijdig door te geven wanneer en hoeveel zeugen u zal nodig hebben. Zo kunnen wij altijd voldoende zeugen voor u voorzien en hebt u steeds de benodigde zeugen op u bedrijf aanwezig ter vervanging. Veel klanten werken reeds lange tijd met een vaste planning. Wilt u ook gerust zijn? Vraag ons dan om voor u een planning op te stellen in functie van jullie bedrijf.