

“洸洋”樂比消毒液(氯化苄二甲羥)

“K.Y.” Rabizol Solution (Benzalkonium Chloride)

【成分】：

有效成分及含量：每ml含 Benzalkonium Chloride 50%.....200mg

其他成分(賦形劑)：Ammonium acetate、Purified Water

【用途(適應症)】：消毒、殺菌

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成分引起過敏的人。

●其他使用上注意事項：

- 不得與肥皂或陰離子性清潔劑混合使用。
- 應避免接觸硝酸鹽，以免產生沉澱。
- 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 避免陽光直射。
- 使用部位或其周圍髒污時，請洗淨後再用藥。
- 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
- 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- 使用於硬水中時，請依上記之1.5~2倍濃度使用。
- 皮革製品使用本劑消毒，多少會變質，使用時應注意。

【用法用量】：

醫藥方面	<p>本劑與當手指消毒劑用之昇汞同一目的，可使用於消毒所有醫療用機械器具、皮膚粘膜以及化膿性創傷、泌尿器之洗滌等，其範圍詳述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 手部之消毒：洗以肥皂再以清水洗淨後，以100~200倍液(1~0.5%)浸洗5分鐘，最後拭以滅菌紗布。 手術領域之消毒：對於手術前無傷痕皮膚之消毒，先以100倍液(1%)洗5分鐘後塗以50倍液(2%)，至於手術前粘膜及裸出皮膚之消毒，則洗以200~1000倍液(0.5~0.1%)，局部麻醉劑及Epirenamine並非本劑之配合禁忌，必要時可參與使用。 耳鼻咽喉科領域：中耳炎、上頸洞蓄膿、咽喉疾患、感染創傷等之洗滌，消毒時用200~1000倍(0.5~0.1%)。 婦產科領域：陰道洗滌用200倍液(0.5%)，又以鑷治療時欲將鑷插入陰道前如以200倍液洗滌，則腫瘍之崩潰產物得以清除，且體溫不升高。 膀胱及尿道洗滌：通常用本液2000~4000倍液，至於膀胱滯留物之洗滌則使用4000倍液(0.025%)。 皮膚科領域：皮膚化膿症、搔癢性濕疹、毛囊炎、難治傷、白癬、絲狀菌感染症、傳染性膿痂疹、疔症、外傷之急救消毒及其他組織表面之擦傷等，以1000倍(0.1%)本液塗布之，使之自然乾燥(1日2~3次)或使用本液濕潤之紗布包紮。 眼科領域：殺菌點眼用400倍液(0.25%)，除蛋白銀、硼酸、硝酸銀、硫酸鋅、水楊酸鹽為本劑之配合禁忌外，其餘點眼藥皆可配合使用。 外科用器具、橡皮製品之消毒：此等先洗以2%蘇打水，拭清後於100倍液中煮沸15分鐘或浸漬30分鐘，由此即使抵抗性很強之芽胞亦可完全滅死。
家庭衛生方面	<ol style="list-style-type: none"> 手指之消毒：為預防傳染病，飯前、便後、外出歸家時手指之消毒，使用100~200倍液，又因本劑無刺激性，不殘留不快氣味，婦女、小孩以及料理前皆可使用。 食器之消毒：通常水洗後以本劑之200~500倍液浸5分鐘以上，而後水洗之，或拭以滅菌布巾。 家屋之消毒：床舖、草蓆、傢俱、浴缸、盥洗室、廁所等之消毒以200~500倍液擦拭或噴霧之。 冰箱、垃圾箱之消毒：100~200倍液。 農家：家畜、家禽小屋、穀物倉庫、桶等之消毒，於經過清除後，噴以200~500倍液。 洗濯物、尿布等之消毒：洗濯乾淨，浸以400倍液並乾燥之。 洗髮消毒：以普通肥皂或洗髮粉等洗後並以清水沖淨後，再洗以200倍液，除消毒外並可使頭髮光澤，防止頭皮之生成。
公共衛生方面	<ol style="list-style-type: none"> 公共場所：為預防傳染病，學校、宿舍、旅館、理髮店、美容院、戲院、娛樂場所等之床舖、浴缸、盥洗室、廁所、電話室等用200~500倍液擦拭或噴霧。 食堂：料理器具、食器、工作場所、廚師及附屬人員手部之消毒，用200~500倍液。 汽車、火車等交通機構之消毒：用200~500倍液擦拭或噴霧。 理髮店、美容院：剪刀、理髮剪、剃刀、梳子等器具之消毒，以肥皂洗除油垢，並用水洗淨後浸於100~200倍液中10分鐘以上。對於理髮剪、剪刀等金屬器之消毒保存，為防止生銹，可於溶液中加0.5~1%之亞硝酸鈉。
生產事業方面	<ol style="list-style-type: none"> 酪業、罐頭、製糖、製餅、製藥工廠等：此等特需注重衛生之工廠，其設備之消毒，以200~500倍液消毒之。 酒廠、清涼飲料工廠：水槽、水桶、輸送管以及容器、瓶罐等之消毒用200~500倍液。 柑橘類之消毒：在裝卸輸出前用600~700倍液洗之，可防止外皮之軟化及生黴。 酪農場：場內設施、牛乳罐、牛乳瓶、牛的乳房等之消毒使用200~500倍液。
其他	<p>增加織造物之柔軟滑膩，增加染色時著色之堅牢，標本之防腐及保存，照相底片細菌為害之防止，養禽畜時火雞黑頭病之預防，養魚業者對鱈魚、鮭魚的鰓病之治療等皆可使用本劑。</p>

附註：

倍液是指本品稀釋倍數；100倍液為本品1個單位加入100單位的水，攪拌而成的稀釋液。

包裝：4000毫升以下塑膠瓶、塑膠罐裝；18公斤以下塑膠桶裝

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

儲存：25°C以下避光儲存



委託者 活洋化學製藥股份有限公司
新北市板橋區信義路26巷10號

製造廠 龍杏生技製藥股份有限公司
臺南市佳里區下營里115之1號A棟