Módulo ou valor absoluto de um número

Façamos uma breve revisão do conceito de módulo de um número.

Se tivermos a reta real e nela os pontos A e B de abscissas 5 e -7 , respetivamente (Figura 1), constatamos que a distância de A à origem é 5 e que a distância de B à origem é 7 (Relembra que não existem distâncias negativas). Essa distância é o **módulo** ou **valor absoluto** do número e representa-se por $|\dots|$.

Figura 1

- A distância de A à origem é 5, ou seja, $|5| = 5$.
- A distância de B à origem é 7, ou seja, $|-7| = 7$.

Em geral:

Número	-10	-6	0	100	...	x
Módulo ou valor absoluto	10	6	0	100	...	$ x $

Assim, se x é um número positivo ou zero, o seu módulo é ele próprio. Contudo, se x for um número negativo, o seu módulo é o seu simétrico.

Assim, pode definir-se o módulo de um número da seguinte forma:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Note-se que $-x$ não significa que se trata de um número negativo, mas sim do simétrico de x . Por exemplo, se $x = -5$, então $-x = -(-5) = 5$. Neste caso $|x| = -x$, ou seja $|-5| = 5$.

Função módulo

Consideremos a função real de variável real definida por $f(x) = |x|$ à qual se designa por **função módulo**.

Note-se que $D_f = \mathbb{R}$.

A função f pode assim ser definida como uma **função definida por ramos** da seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

O gráfico da função módulo pode ser definido por duas semirretas já conhecidas: uma contida na bissetriz dos quadrantes pares e a outra na bissetriz dos quadrantes ímpares.

Figura 2

Figura 3

Sabemos que um módulo é sempre não negativo e isso vê-se, claramente, no gráfico da função módulo cujo contradomínio é $[0; +\infty[$.

Na calculadora gráfica (TI - Figuras 4 e 5; Casio - Figuras 6, 7 e 8) para se obter o gráfico da função módulo faz-se o seguinte:

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Todas as transformações de funções estudadas anteriormente são também válidas para a função módulo.

Assim, vamos representar graficamente algumas funções e indicar o domínio, o contradomínio e os zeros.

$$\checkmark y = |x| + 2$$

O gráfico de $y = |x| + 2$ é obtido a partir do gráfico de $y = |x|$ por uma translação associada ao vetor $\vec{u}(0; 2)$.

- $D = \mathbb{R}$
- $D' = [2; +\infty[$
- $|x| + 2 = 0 \Leftrightarrow |x| = -2$

Como a condição $|x| = -2$ é impossível, a função não tem zeros.

Figura 9

Se quiséssemos definir esta função por ramos, ficaria:

$$y = \begin{cases} x + 2 & \text{se } x \geq 0 \\ -x + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$\checkmark y = |x| - 3$$

O gráfico de $y = |x| - 3$ é obtido a partir do gráfico de $y = |x|$ por uma translação associada ao vetor $\vec{u}(0; -3)$.

- $D = \mathbb{R}$
- $D' = [-3; +\infty[$
- $|x| - 3 = 0 \Leftrightarrow |x| = 3 \Leftrightarrow x = 3 \vee x = -3$

Zeros: $\{-3; 3\}$

Figura 10

Se quiséssemos definir esta função por ramos, ficaria:

$$y = \begin{cases} x - 3 & \text{se } x \geq 0 \\ -x - 3 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

✓ $y = |x - 4|$

O gráfico de $y = |x - 4|$ é obtido a partir do gráfico de $y = |x|$ por uma translação associada ao vetor $\vec{u}(4; 0)$.

- $D = \mathbb{R}$
- $D' = [0; +\infty[$
- $|x - 4| = 0 \Leftrightarrow x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4$

Zeros: $\{4\}$

Figura 11

Se quiséssemos definir esta função por ramos, ficaria:

$$y = \begin{cases} x - 4 & \text{se } x - 4 \geq 0 \\ -x + 4 & \text{se } x - 4 < 0 \end{cases}$$

ou seja,

$$y = \begin{cases} x - 4 & \text{se } x \geq 4 \\ -x + 4 & \text{se } x < 4 \end{cases}$$

✓ $y = |x - 1| - 2$

O gráfico de $y = |x - 1| - 2$ é obtido a partir do gráfico de $y = |x|$ por uma translação associada ao vetor $\vec{u}(1; -2)$.

- $D = \mathbb{R}$
- $D' = [-2; +\infty[$
- $|x - 1| - 2 = 0 \Leftrightarrow |x - 1| = 2$
 $\Leftrightarrow x - 1 = 2 \vee x - 1 = -2 \Leftrightarrow$
 $x = 3 \vee x = -1$

Zeros: $\{-1; 3\}$

Figura 12

Para definir esta função por ramos começa-se por definir a função $y = |x - 1|$.

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x - 1 \geq 0 \\ -x + 1 & \text{se } x - 1 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow |x - 1| = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \geq 1 \\ -x + 1 & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

Logo,

$$|x - 1| - 2 = \begin{cases} x - 1 - 2 & \text{se } x \geq 1 \\ -x + 1 - 2 & \text{se } x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 & \text{se } x \geq 1 \\ -x - 1 & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

$$\checkmark y = -|x| + 5$$

O gráfico de $y = -|x| + 5$ é obtido a partir do gráfico de $y = |x|$ por uma reflexão de eixo Ox seguida de uma translação associada ao vetor $\vec{u}(0; 5)$.

- $D = \mathbb{R}$
 - $D' =] - \infty; 5]$
 - $-|x| + 5 = 0 \Leftrightarrow |x| = 5 \Leftrightarrow x = 5 \vee x = -5$
- Zeros: $\{-5; 5\}$

Figura 13

Para definir esta função por ramos começa-se por definir a função $y = -|x|$.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow -|x| = \begin{cases} -x & \text{se } x \geq 0 \\ x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Logo,

$$y = -|x| + 5 = \begin{cases} -x + 5 & \text{se } x \geq 0 \\ x + 5 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$\checkmark y = 2|x + 1|$$

O gráfico de $y = 2|x + 1|$ é obtido a partir do gráfico de $y = |x|$ por uma translação associada ao vetor $\vec{u}(-1; 0)$ seguida de uma dilatação vertical de coeficiente 2.

Figura 14

- $D = \mathbb{R}$
- $D' = [0; +\infty[$
- $2|x + 1| = 0 \Leftrightarrow |x + 1| = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$
- 1
- Zeros: $\{-1\}$

Para definir esta função por ramos começa-se por definir a função $y = |x + 1|$.

$$|x + 1| = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x + 1 \geq 0 \\ -x - 1 & \text{se } x + 1 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow |x + 1| = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq -1 \\ -x - 1 & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

Logo,

$$y = 2|x + 1| = \begin{cases} 2(x + 1) & \text{se } x \geq -1 \\ 2(-x - 1) & \text{se } x < -1 \end{cases} \Leftrightarrow 2|x + 1| = \begin{cases} 2x + 2 & \text{se } x \geq -1 \\ -2x - 2 & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

O gráfico da função $y = a|x - b| + c$ obtém-se a partir do gráfico de $y = |x|$ aplicando-lhe uma translação de vetor $\vec{u}(b; 0)$ seguida de:

- uma dilatação vertical de coeficiente $|a|$ se $|a| > 1$;
- uma contração vertical de coeficiente $|a|$ se $|a| < 1$;
- uma reflexão de eixo ox se $a < 0$;
- uma translação de vetor $\vec{v}(0; c)$.

E se quisermos fazer o esboço da função $f(x) = |x^2 - 4|$?

Começa-se por desenhar a função $y = x^2 - 4$.

Sabe-se que o módulo de um número positivo é o próprio número, logo, a parte positiva da função mantém-se. O módulo de um número negativo é o seu simétrico. Assim, a parte negativa da função *terá de passar* para o simétrico em relação ao eixo Ox .

Fica então:

Figura 15