

角膜潰瘍

說明

- 角膜為透明無血管，具有折射光線，保護眼睛的功能。
- 角膜發炎、潰瘍會有疼痛、畏光、流淚的症狀。
- 潰瘍形狀、大小、顏色會因病菌種類及感染程度而異。
- 角膜潰瘍癒合後殘留瘢痕組織會造成視力障礙。
- 角膜潰瘍若診治延誤或病程過長都有可能造成角膜穿孔而致失明。

治療方法

- 全身性用藥：依菌種不同利用靜脈注射給藥，但通常只要保留在懷疑細菌侵犯內眼部時使用。
- 局部性用藥：為最主要用藥方法，依潰瘍菌種不同給予眼藥水點用。
- 傷口清除術：每日醫生檢查，視潰瘍情形給予必要之傷口清除，減少菌量，便於藥物滲入。
- 眼瞼縫合術：潰瘍處已無菌種生長，而表皮破損且癒合困難者，眼瞼縫合可協助傷口處快速癒合。
- 角膜移植術：潰瘍痊癒後，因角膜白癍而影響視力時，視情況給予角膜移植。

照護須知

- 接觸患眼前、後應洗手。
- 有溢淚或分泌物時，勿用手或手帕、衛生紙擦拭，應以無菌棉籤清除並保持患眼清潔。
- 避免患側分泌物流到健側，盡可能躺向患側或平躺。
- 飲食活動無限制，但避免刺激性食物。
- 洗澡、洗頭時避免生水潑入患眼。
- 若覺疼痛，可依醫囑服用止痛藥。
- 定期返院複查，出院後如有疼痛加劇，分泌物或有膿性分泌物流出應立即返院複診。



如您有任何視力的問題，歡迎來電 (06) 279-6655，我們將竭誠為您服務。

台南同喬眼科 台南市仁德區中正路 3 段 1 號