

遠視

病因

影像聚焦於視網膜之後，眼軸過短或眼角膜與水晶體之屈折力過小所致。

- 眼球之水晶體大小及眼軸均正常，但光線進入角膜時，因角膜之光線屈折力微弱，所引起的『屈折性遠視』。
- 調節水晶體大小的『睫狀肌』天生性之調節力弱，使光線穿透水晶體時，因『睫狀肌』調節力無法把眼軸拉成正常長度，因眼軸太短，致使影像投射聚焦在視網膜後方，是為『軸性遠視』。

症狀

年輕時睫狀肌調節能力足以將遠視焦點拉前至視網膜上，而使中度或輕度的遠視患者看遠視力仍佳，隨著年紀增長，調節力減弱，近距離視力開始模糊而提早出現老花症狀。

診斷

中度(400度)以上之遠視可能造成閱讀困難或弱視，應配眼鏡矯正，亦應實施弱視訓練，年紀越小治療之機會越大，兒童之遠視會隨著年紀增加而降低度數。輕度遠視年輕時不必配鏡，但年紀增長後若出現近距離閱讀疲勞之症狀，即應配眼鏡矯正。



如您有任何視力的問題，歡迎來電 (06) 279-6655，我們將竭誠為您服務。

台南同喬眼科 台南市仁德區中正路3段1號