



Beste Klant,

Eind dit jaar organiseert Danapig 2 interessante info avonden:

- Op woensdag 11 december in feestzaal Molenhof in Brecht
- Op dinsdag 17 december 2019 in D' oude Melkerij in Gits.

Meer info volgt later maar hou deze datums alvast vrij!

Hieronder enkele tips in verband met het dekmanagement. Binnenkort is het september en dit is steeds de periode waarin meer herlopers voorkomen, het is dus uitermate belangrijk om alle basis elementen goed te controleren:

1. Als een zeug uit de dekgroep niet bronstig is geworden terwijl alle andere zonder problemen berig werden, ga dan alle opties na. Probeer verbanden te ontdekken met gevallen uit andere dekgroepen. Het is belangrijk goed bij te houden met welke zeugen dit voorkomt en wat de aanleiding(en) kan zijn:
  - a. Kraamstalbronst
  - b. Te groot conditieverlies, probeer het conditieverlies te beperken tot 4mm spek tijdens de kraamstalperiode
  - c. Zit te dicht bij de zoekbeer.
2. Zorg voor veel, vers water, na spenen is het belangrijk dat de zeugen veel kunnen drinken, dit is onder andere belangrijk om een voldoende hoge voeder opname te bekomen tijdens de gustedagen
3. Voeder de zeugen tussen spenen en dekken 2 maal daags om zo een goede dagopname in deze periode te bekomen
4. Controleer dagelijks de werking van de bewaarkast voor het sperma. Zorg dat er altijd een goede minimum-maximum thermometer aanwezig is. Op deze manier kan je controleren hoe constant de temperatuur in de kast is. Temperatuurschommeling hebben een negatief effect op de bewaring van het sperma.
5. Check na grote veranderingen in de bedrijfsvoering opnieuw de bronstlengte. Met de duur van de bronstlengte zal ook het inseminatiemoment veranderen. Renovaties of aanpassingen in de dekstal kunnen meteen voor een verandering van bronstlengte



zorgen.

6. Controleer de gedekte zeugen één keer per dag met de beer. Start op dag 18 na de inseminatie met deze controle. Zorg dat zeugen die gecontroleerd moeten worden, als groep bij elkaar zitten